

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** сергей  
**Возраст:** 24  
**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна  
**Специализация:** Уролог  
**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 12.12.2006 18:05:06  
**формирования заключения врача:** 13.12.2006 07:44:51

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/20772/answer/20773>



## Заключение врача

Уважаемый Сергей! Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) является причиной уретерогидронефроза. Это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи). Лечение этого вида аномалии зависит от вида рефлюкса, его степени, частоты обострений пиелонефрита, общего состояния ребенка. Если степень рефлюкса небольшая (1-2), иногда назначают длительные курсы антибактериальной терапии (в течение нескольких месяцев). В некоторых случаях (1-2 степень) рефлюкс самостоятельно проходит к 9-10 годам. Если же степень рефлюкса высокая (3), и существует неблагоприятный общий фон, то тогда предлагается оперативное лечение - антирефлюксная операция. Пока необходимо соблюдать диету (исключить острое, соленое), давать ребенку отвары мочегонных трав (кукурузные рыльца по 1 ст. л. 3 раза в день). При повышенном содержании оксалатов в моче всегда с осторожностью назначают препараты, содержащие аскорбиновую кислоту (а она входит в состав всех витаминов). Поэтому Вам надо проконсультироваться с Вашим лечащим врачом. С уважением.