

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Аня

Возраст: 43

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.01.2007 21:41:20

формирования заключения врача: 23.01.2007 07:45:42

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/21436/answer/21437>



Заключение врача

Уважаемая Аня! Парауретральные кисты, как правило, бывают ретенционными и обусловлены облитерацией (закупоркой) выводных протоков желез, располагающихся в слизистой оболочке. Возникновению кист могут способствовать перенесенные воспалительные заболевания (уретриты различного происхождения), травмы и т. д. Кисты чаще всего одиночные, небольших размеров, склонны к увеличению. Симптоматика долгое время может быть стабильной, стертой. При инфицировании кисты возникают признаки острого гнойного воспаления с образованием свища, открывающегося в просвет мочеиспускательного канала или наружу. У женщин кисты чаще всего локализуются около наружного отверстия мочеиспускательного канала. Небольшие кисты удаляют путем вылушивания. Обратному развитию киста, как правило, не подвергается. Что касается осложнений хирургического лечения кист, то, Вы понимаете, что в умелых руках риск развития осложнений минимален. После удаления никаких особенностей и последствий, как правило, не бывает. Удачи!