

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Инна

**Возраст:** 38

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 01.02.2007 20:49:57

**формирования заключения врача:** 05.02.2007 07:34:41

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/21680/answer/21681>



## Заключение врача

Уважаемая Инна! Возможно, имеет место гиперативный мочевой пузырь. Но сначала необходимо исключить инфекцию мочевыводящей системы. Для этого необходимо обследоваться на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы; сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. При невыясненном диагнозе - цистоскопия (инструментальный осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря), УЗИ почек и мочевого пузыря (с определением количества остаточной мочи), уродинамическое обследование. После получения анализов можно подобрать схему лечения. Выздоровливайте.