

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Светлана

**Возраст:** 37

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.04.2011 15:26:26

**формирования заключения врача:** 11.04.2011 16:58:52

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/220534/answer/220558>



## Заключение врача

Для более полной оценки нужны ещё данные, есть ли изменения обеих почек? сохранен ли кровоток в паренхиме почек? тем не менее прерывание беременности в данном сроке очень сложная проблема. вам нужно в настоящее время как минимум динамически наблюдать состояние почек, оценивать паренхиму, размеры ЧЛС. заранее проконсультироваться хирургами новорожденных на предмет необходимости операции сразу после рождения или дальнейшего наблюдения. заболевание это опасно для ребенка тем что нарушение нормально оттока мочи может привести к сдавлению паренхимы почки мочой и её атрофии. но если моча в мочеточниках и мочевом пузыре есть , значит почки работают.