

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** глафира

**Возраст:** 34

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.04.2011 20:37:06

**формирования заключения врача:** 12.04.2011 08:21:04

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/220628/answer/220694>



## Заключение врача

эта ситуация требует наблюдения и контроля. очень хорошо, что лоханка уменьшилась с 15 до 8 мм, есть вероятность, что с возраст все придет в норму. что нужно контролировать - кровоток и толщину паренхимы почки, размер ЧЛС и мочеточника, лучше это делать в специализированных центрах, которые занимаются этой патологией (в москве это филатовская больница у детей до 1 года). причин этого состояние может быть много, это заброс мочи обратно из мочевого пузыря, нарушение проходимости в области соединения мочевого пузыря и мочеточника (нарушает проходимость мочи), нарушение проходимости в области соединения почки и мочеточника. грозит это снижением функции почки, поэтому в возрасте 7-8 месяцев можно сделать статическую нефросцинтиграфию для оценки состояния почек(при отсутствие отрицательной динамики по УЗИ). если будут ещё вопросы-обращайтесь лично.