

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Андрей

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 19.02.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 19.02.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/2240/answer/2241>



## Заключение врача

Здравствуйте, Андрей! Очень трудно что-либо посоветовать в Вашем случае – нужен непосредственный осмотр, т. к. Ваши ощущения субъективны, а при осмотре выясняются факты. Вы совершенно правы в том, что связываете хронический простатит с частотой половых контактов. В возникновении хронического простатита имеет значение не только инфекционный фактор, но и застой в предстательной железе, в результате которого секрет простаты накапливается в ткани железы, уплотняется. Такие очаги являются очагами хронического воспаления, которые могут вспыхнуть при любом предрасполагающем факторе (сидячая работа, переохлаждение, перенесенные простудные заболевания и т. д.). При застойном компоненте простатита показано проведение массажа предстательной железы, после которого ацинусы дренируются, происходит отток воспалительного секрета, и, соответственно, улучшение состояния. Воспаление предстательной железы в некоторых случаях может осложниться развитием воспаления в придатках яичек (эпидидимитом). Но это воспаление характеризуется сильными болями, отеком мошонки. Поэтому, чтобы устранить сомнения, обратитесь к своему лечащему урологу, он более точно информирован насчет Вашего заболевания (знает Ваше состояние, анализы, результаты обследований и т. д.). Если будут еще вопросы, пишите. [Шадёркин И.А.](#)