

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Zolga

**Возраст:** 18

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 07.03.2007 12:47:24

**формирования заключения врача:** 09.03.2007 10:38:04

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/22412/answer/22413>



## Заключение врача

Уважаемая Zolga! Причиной гидронефроза в Вашем случае, вероятнее всего, является стриктура ЛМС (судя по Вашему описанию). Если бы причиной был пузырно-мочеточниковый рефлюкс небольшой степени, то он мог пройти к 9-10 годам. Стриктура (сужение ЛМС) самостоятельно не пройдет. Вам надо проконсультировать ребенка у детского уролога, чтобы определиться с необходимостью оперативного лечения. Так как при длительном существовании гидронефроза и сопутствующем воспалительном процессе может произойти постепенное уменьшение толщины паренхимы почки (ее функциональной части), сморщивание почки (либо наоборот гидронефротическая трансформация), что приведет к хронической почечной недостаточности. Количество мочи за один раз нормальное. С уважением.