

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: олеся

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.02.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 19.02.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/2246/answer/2247>



Заключение врача

Уважаемая Олеся! Судя по описанию, скорее всего у Вашего сына сужение крайней плоти (фимоз). У детей фимоз бывает врожденным, потом он разрешается сам. По данным разных авторов головка полового члена должна открыться к 4-5 годам. В некоторых случаях, когда фимоз очень выражен, он может препятствовать нормальному мочеиспусканию (ребенок плачет и натуживается перед тем, как помочиться). Во взрослом возрасте фимоз создает проблемы в половой жизни, кроме того, препуциальный мешок является местом скопления смегмы (выделения сальных желез, расположенных в этой области). При фимозе невозможно проведение в полном объеме гигиенических мероприятий, смегма полностью не удаляется, разлагается – поэтому появляется неприятный запах. Фимоз опасен не только постоянным наличием инфекции. Смегма обладает канцерогенным действием, т.е. может вызывать рак головки полового члена. Вам нужно обратиться к урологу по месту жительства – он назначит необходимые обследования и при необходимости – лечение. У детей возможно постепенное растягивание крайней плоти (во время купания рекомендуется насколько можно приоткрывать головку каждый раз прилагая чуточку усилий), при таком способе открытие головки полового члена происходит, конечно, не сразу, иногда полгода-год. Если при подобных ежедневных процедурах не удастся все-таки открыть головку, то, возможно, потребуются оперативное лечение – операция по иссечению крайней плоти (циркумцизио). Пишите, если будут вопросы.

[Шадёркин И.А.](#)