

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: ПАВЕЛ

Возраст: 38

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.03.2007 22:59:39

формирования заключения врача: 18.03.2007 20:09:10

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/22574/answer/22575>



Заключение врача

Уважаемый Павел! После операции, приблизительно до 2-х месяцев (может, чуть больше), происходит запустевание вен яичка и семенного канатика. В этот период вены еще не спавшиеся, могут быть видны на УЗИ, пальпироваться, определяться в мошонке. Так как запустевают вены, в этот период идет перестройка кровообращения в мошонке, с этим связаны боли, временный дискомфорт в мошонке, заднем проходе, промежности. Также может наблюдаться временное незначительное увеличение яичка в размерах. Но во время операции иногда вместе перевязываются венозные и лимфатические стволы, в результате нарушается отток лимфы от мошонки и её органов. В связи с этим возникает стойкое увеличение яичка, которое, впрочем, сильно не влияет на его функцию. Если нет повышения температуры, боль не увеличивается, анализы нормальные, то необходимо просто подождать. Лечения в этой ситуации не существует, все симптомы проходят самостоятельно. Если же с момента операции прошло больше 2-х месяцев, то можно думать о неполном прекращении патологического венозного тока. Такое встречается при рассыпном (много вен) типе строения яичковой вены. В случае сомнений, лучше всего, обратиться к своему оперирующему урологу. С уважением.