

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Татаров Казбек

**Возраст:** 61

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.03.2007 22:15:49

**формирования заключения врача:** 24.03.2007 21:25:32

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/22704/answer/22705>



## Заключение врача

Уважаемый Казбек Константинович! 1. Камни лоханки, если они вызывают резкое нарушение мочеоттока (о чем свидетельствует почечная колика), необходимо удалять. Размеры камней некрупные, поэтому их можно подвергнуть дистанционному дроблению (ДЛТ). Еще одним методом в Вашем случае может быть нефролитолапаксия - чрезкожное дробление и удаление фрагментов камня. Оперироваться или нет - это только Ваше решение и Ваше желание. Камень, вероятнее всего, сам не отойдет, никакими консервативными методами его «растворить» нельзя. В дальнейшем камень будет расти, а функция почки снижаться. Поэтому я бы рекомендовала камень все же удалить. Какой метод операции выбрать - это надо решать Вашим урологам, заочно такие вопросы решить невозможно. 2. Насчет «нашей клиники» Вы что-то путаете. У нас обычная центральная районная больница. С уважением.