

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алёна

Возраст: 44

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.03.2007 05:27:56

формирования заключения врача: 26.03.2007 12:40:45

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/22722/answer/22723>



Заключение врача

Уважаемая Алёна! Вероятнее всего, имеет место хронический шейный цистит в сочетании с гиперактивным мочевым пузырем. Если емкость мочевого пузыря уменьшена (это можно проверить по УЗИ или по тому, какое количество жидкости Вы можете удержать), то можно заподозрить интерстициальный цистит (симптомокомплекс нарушений мочеиспускания, ведущий к уменьшению емкости мочевого пузыря). Характерными симптомами являются позывы на мочеиспускание, учащение мочеиспускания, никтурия (мочеиспускание в ночное время), боли в надлобковой области или в проекции мочевого пузыря, стихающая после мочеиспускания. Интерстициальный цистит еще называют диагнозом исключения, т. е. сначала надо исключить все другие заболевания мочевого пузыря. Если в результате обследования они исключены, тогда и устанавливается диагноз интерстициального цистита. Все эти вопросы требуют разрешения только на очном приеме. Удачи!