

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Рафаель

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.06.2011 14:29:28

формирования заключения врача: 24.06.2011 18:33:40

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/230227/answer/230253>



Заключение врача

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс такой степени можно наблюдать при постоянном контроле анализов мочи и при наличии инфекции приеме антибиотиков, профилактически - уросептиков (фурамаг, фурагин). Желательно в возрасте 6 мес сделать статическую нефросцинтиграфию, которая покажет есть ли выраженное нарушение функции почек. Наблюдать до 1 года, при увеличении степени рефлюкса или при ухудшении показателей статической нефросцинтиграфии или при персистенции инфекции - можно сделать эндоскопическую коррекцию рефлюкса, при неэффективности - открытое вмешательство. Все эти манипуляции можно сделать по квоте в . При возможности пришлите снимки на электронную почту, для уточнения степени рефлюкса.