

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.02.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 24.02.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/2328/answer/2329>



Заключение врача

Уважаемый Сергей! Нефроптоз - опущение почек, бывает врожденным и приобретенным, опущение такой степени, как у Вашей жены можно расценить как выраженный. Нефроптоз консервативно не лечится - из неоперативных методов иногда рекомендуют ограничение физических нагрузок, переохлаждения, и лечебная физкультура (специальный комплекс упражнений). Если, несмотря на эти меры, будет сохраняться повышенная температура, если будут часто повторяться атаки пиелонефрита (воспаление почек), то тогда рекомендуется провести оперативное лечение (нефропексия - «подшивание» почки). Увеличение веса не приведет к нормализации положения почки, кроме того, набрать 6 кг довольно сложно. Дело не в весе, не в количестве жировой клетчатке, а в слабости связочного аппарата почки. Если есть нефроптоз, то есть возможность образования камней и обострения пиелонефрита будут сохраняться вследствие нарушения оттока мочи. Наличие постоянной субфебрильной температуры - это признак существования в организме очага хронической инфекции, вероятнее всего, у Вашей жены - это хронический пиелонефрит. Лечение от ЦМВ, конечно, надо проводить, лучше до операции. Выбор препарата лучше остановить на том, который рекомендует доктор. Я, в рамках заочной консультации, не могу и не имею морального права оценивать лечение, назначенное другим врачом, т. к. мне неизвестны многие моменты в обследовании, осмотре, особенностях течения заболевания и т. д. Думаю, что если удачно пройдет лечение от ЦМВ, то проблем с будущим ребенком не будет. Единственное, что Вашей жене обязательно надо будет всю беременность наблюдаться у уролога по месту жительства, делать контрольные анализы мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря. Это делается для своевременной диагностики возможных осложнений. Пишите, если будут вопросы. [Шадёркин И.А.](#)