

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Валерий

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.02.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 28.02.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/2416/answer/2417>



Заключение врача

Уважаемый Валерий! Симптом неполного опорожнения мочевого пузыря характерен для воспалительного процесса в предстательной железе (хронического простатита). В результате воспалительной инфильтрации простаты происходит нарушение мочеоттока из мочевого пузыря, при этом в нем остается повышенное количество остаточной мочи (в норме до 20 мл). Для уточнения диагноза, Вам надо обследоваться: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды и др.), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), секрет простаты. Пишите, если будут вопросы. [Шадёркин И.А.](#)