

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Геннадий Борисович

**Возраст:** 78

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.10.2011 11:16:15

**формирования заключения врача:** 29.10.2011 13:05:03

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/244784/answer/245089>



## Заключение врача

1. Если нет большой зияющей раны, то объём баллончика - максимум - 20 см<sup>3</sup>(мл). 2. Зачем фокусин - действительно непонятно (цистон - растительный препарат, можно принимать в любом случае). 3. Учитывая возрастающее ПСА и наличие мтс, самый быстрый и простой метод андрогенной блокады билатеральная орхидэктомия (удаление обоих яичек). Операция делается под местной анестезией и длится - 20 мин с обеих сторон вместе с анестезией. Первоначальное улучшение наступает сразу (через 2-3 дня - по факту прекращения выработки андрогенов). Я работаю в Люберцах в ЛРБ №1. Орхидэктомию можно сделать у нас. Напишите мне на почту. Тел. 8-903-544-49-35 (от 10 до 20 часов).