

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Геннадий Борисович

Возраст: 78

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.10.2011 11:16:15

формирования заключения врача: 29.10.2011 13:05:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/244784/answer/245089>



Заключение врача

1. Если нет большой зияющей раны, то объём баллончика - мах - 20 см³(мл). 2. Зачем фокусин - действительно непонятно (цистон - растительный препарат, можно принимать в любом случае). 3. Учитывая возрастающее ПСА и наличие мтс, самый быстрый и простой метод андрогенной блокады билатеральная орхидэктомия (удаление обоих яичек). Операция делается под местной анестезией и длится - 20 мин с обеих сторон вместе с анестезией. Первоначальное улучшение наступает сразу (через 2-3 дня - по факту прекращения выработки андрогенов). Я работаю в Люберцах в ЛРБ №1. Орхидэктомию можно сделать у нас. Напишите мне на почту. Тел. 8-903-544-49-35 (от 10 до 20 часов).