

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Трапезникова Туйара Семеновна

Возраст: 52

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.08.2011 07:12:50

формирования заключения врача: 18.08.2011 22:51:58

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/245860/answer/245861>



Заключение врача

Уважаемый Трапезникова Туйара Семеновна! Вероятнее всего, у Вас имеет место стрессовое недержание мочи. Для подтверждения этого диагноза нужен осмотр на кресле, выполнение КУДИ - комплексного уродинамического исследования. Если диагноз подтвердится, то в такой ситуации какие-либо консервативные методы лечения (антибиотики и другие препараты) малоэффективны. На сегодняшний день хорошо зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи является субуретральный слинг. Это ряд операций, смысл которых заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Это TVT, TOT, IVS и др. Такие операции выполняются практически в амбулаторных условиях (в разных клиниках по-разному). Удачи!