

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ирина

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 07.03.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 07.03.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/2524/answer/2525>



## Заключение врача

Уважаемая Ирина! Искренне рад, что чем-то смог помочь Вам и Вашей бабушке. Но все-таки хочу напомнить, что наши советы носят только рекомендательный характер, что последнее слово в лечении остается за Вашим врачом. Несмотря на всю подробность вопроса, я не могу знать всех нюансов состояния, течения заболевания Вашей бабушки, не могу воочию ознакомиться с результатами обследований. Думаю, что врачи, которые лечат Вашу бабушку, имеют достаточно опыта и знаний для лечения такого рода состояний. То, что у Вашей бабушки случилось с рукой (повторяю, что могу ошибаться в силу заочности консультации), вероятнее всего, является реакцией на внутривенное введение каких-то препаратов (в виде флебита – воспаление вены, обычно проявляется покраснением по ходу вены), или на компрессы, мази (т. е. на местное применение препаратов). Если бы это была аллергическая реакция на леспеплан, то она проявилась бы в виде общей реакции, а не только на руке. В любом случае сейчас надо понаблюдать и, по возможности, выяснить, что явилось причиной покраснения и отека руки. Если не подходит супрастин, его можно заменить любым другим антигистаминным препаратом. Полифепан – препарат, который получают при гидролизе древесины. При приеме внутрь обладает способностью адсорбировать бактерии и токсины в желудочно-кишечном тракте. Энтеродез (аналог гемодеза для приема внутрь) – синтетический препарат, также обладает способностью связывать токсины, поступающие в желудочно-кишечный тракт или образующиеся в организме (как у Вашей бабушки), и выводить их через кишечник. У каждого из этих препаратов есть свои особенности. Вашей бабушке пока можно принимать один Полифепан (именно в перерывах между едой, длительность курса около 3 недель). Контролировать шлаки крови (о них я писал в прошлый раз), при их нарастании можно попробовать принимать энтеродез. Белок содержится в мясе, яйцах, бобовых продуктах. Пишите, буду рад Вам. Но повторяю, что все надо согласовывать с лечащим врачом. Удачи!

[Шадёркин И.А.](#)