

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Кирилл. 23года

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.03.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 09.03.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/2542/answer/2543>



Заключение врача

Уважаемый коллега! Вероятнее всего, у Вас был воспалительный процесс в предстательной железе, но какого рода и чем был вызван, надо было выяснить. Обычно я рекомендую пройти следующее обследование: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, КАНДИДЫ и др.), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), секрет простаты. Течение кандидозной инфекции, как и любой другой, возможно без проявления в общем анализе мочи, посевах, в биохимическом и общем анализе крови. Но при ПЦР-диагностике, особенно если сделать провокацию (0,5 мл гоновакцины за сутки до предполагаемого исследования), то вероятность положительного анализа высока (если есть инфекция). Сыпь, которая появилась у Вас после лечения антибактериальными препаратами, может быть проявлением аллергии. Сейчас Ваша тактика заключается в определении причины возникшего состояния (т. е. обследовании). Если подтвердится диагноз кандидоза, то пишите, определимся с дальнейшим лечением. С уважением. [Шадёркин И.А.](#)