

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Кирилл. 23года

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.03.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 09.03.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/2542/answer/2543>



## Заключение врача

Уважаемый коллега! Вероятнее всего, у Вас был воспалительный процесс в предстательной железе, но какого рода и чем был вызван, надо было выяснить. Обычно я рекомендую пройти следующее обследование: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, КАНДИДЫ и др.), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), секрет простаты. Течение кандидозной инфекции, как и любой другой, возможно без проявления в общем анализе мочи, посевах, в биохимическом и общем анализе крови. Но при ПЦР-диагностике, особенно если сделать провокацию (0,5 мл гоновакцины за сутки до предполагаемого исследования), то вероятность положительного анализа высока (если есть инфекция). Сыпь, которая появилась у Вас после лечения антибактериальными препаратами, может быть проявлением аллергии. Сейчас Ваша тактика заключается в определении причины возникшего состояния (т. е. обследовании). Если подтвердится диагноз кандидоза, то пишите, определимся с дальнейшим лечением. С уважением. [Шадёркин И.А.](#)