

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Асель

Возраст: 60

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.09.2007 15:32:11

формирования заключения врача: 04.09.2007 18:25:42

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/26053/answer/26054>



Заключение врача

Уважаемый Асель! Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) может являться причиной уретерогидронефроза. Это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи), и хронический рецидивирующий цистит. Лечение этого вида аномалии зависит от вида рефлюкса, его степени, частоты обострений пиелонефрита, общего состояния ребенка. Если степень рефлюкса небольшая (1-2), иногда назначают длительные курсы антибактериальной терапии (в течение нескольких месяцев). В некоторых случаях (1-2 степень) рефлюкс самостоятельно проходит к 9-10 годам. Если же степень рефлюкса высокая (3), и существует неблагоприятный общий фон, то тогда предлагается оперативное лечение - антирефлюксная операция. Пока необходимо соблюдать диету (исключить острое, соленое), давать ребенку отвары мочегонных трав (кукурузные рыльца по 1 ст. л. 3 раза в день). Также надо сдать мочу на флору и чувствительность к антибиотикам, и дальнейшую терапию проводить согласно результатам посева. С уважением.