

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 47

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 06.09.2007 11:57:21

формирования заключения врача: 06.09.2007 20:27:27

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/26091/answer/26092>



Заключение врача

Уважаемая Елена! Урахус - мочевой проток, который в эмбриональной жизни находится в толще пупочного канатика. В норме урахус после рождения ребенка превращается в срединную пупочную связку, начинающуюся у верхушки мочевого пузыря и доходящую почти до пупка. В некоторых случаях облитерация (закрытие) урахуса совершенно не имеет места, либо происходит местами. В последнем случае возникают более или менее значительные, обособленные кисты выше мочевого пузыря, выпячивающиеся по средней линии передней брюшной стенки. Кисты урахуса бывают разной величины, иногда они достигают огромных размеров. Большинство из них представляют совершенно замкнутыми, иногда сообщаются тонким свищевым ходом с наружной средой (в этом случае моча начинает выделяться через пупок) или мочевым пузырём. Содержимое кисты - обычно серозное, в случае присоединения инфекции - гнойное. Кисты мочевого протока длительное время могут протекать бессимптомно, и впервые проявляться уже у взрослого человека - возникает мочевой свищ, этому предшествуют боли в животе и дизурические расстройства. Большие кисты могут давать явления сдавления кишечника и быть причиной болей в животе. Киста может прорваться в мочевой пузырь, в пупок, особенно при присоединении инфекции. Распознавание кист урахуса происходит с помощью осмотра, пальпации, в случае наличия свища - выделения мочи через пупок при натуживании или надавливании на брюшную стенку, помогает в распознавании кист урахуса введение в мочевой пузырь контрастных веществ и последующая рентгенография, внутривенное введение индигокармина. Лечение описанных аномалий - только оперативное. Объём обследования и лечения определяет врач уролог или хирург. Думаю, Вам надо прислушаться к мнению своих врачей. Выздоровливайте.