

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Alex

**Возраст:** 75

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.09.2007 20:52:24

**формирования заключения врача:** 25.09.2007 22:46:03

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/26445/answer/26446>



## Заключение врача

Уважаемый Alex! Камни лоханки, если они вызывают резкое нарушение мочеоттока, необходимо удалять. Это может быть ДЛТ (дистанционная литотрипсия), нефролитолапаксия (чрезкожное удаление камня). Параллельно с удалением камня необходимо лечить воспалительный процесс. Для этого до операции необходимо сделать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам и проводить лечение согласно результату посева. В послеоперационном периоде необходимо будет определить состав камня (в лаборатории), скорректировать диету, водный режим, проводить контроль общего анализа крови, мочи и биохимии крови. Камень размером 1 см сам не отойдет, никакими консервативными методами его «растворить» нельзя. В дальнейшем камень будет расти, а функция почки снижаться. Поэтому я бы рекомендовала камень все же удалить. Какой метод операции выбрать – это надо решать Вашим урологам, заочно такие вопросы решить невозможно.