

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Аня

**Возраст:** 38

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.12.2007 15:42:17

**формирования заключения врача:** 26.12.2007 22:39:56

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/28505/answer/28506>



## Заключение врача

Уважаемая Аня! Уточните следующие моменты - обследовались ли Вы на заболевания, передающиеся половым путем, какая концентрация кишечной палочки была в посевах, сдавали ли Вы после лечения контрольный посев мочи на флору, какой результат. Также необходим осмотр на гинекологическом кресле. Обострение, связанное с половым актом, можно объяснить тем, что у Вас имеет место низкое расположение наружного отверстия уретры, т. е. близко к влагалищу. Конечно, я это могу только предполагать. Поэтому во время полового акта происходит заброс микрофлоры из влагалища к уретре, отсюда и возникают дизурические явления. Если Вы серьезно настроены вылечиться, пришлите мне на почту [ViktoriaShade@uroweb.ru](mailto:ViktoriaShade@uroweb.ru) все свои обследования и лечение в хронологическом порядке (описания, результаты). С уважением.