

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: alex

Возраст: 45

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 06.01.2008 15:18:38

формирования заключения врача: 06.01.2008 21:11:55

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/28703/answer/28704>



Заключение врача

Уважаемый аlex! Давление и ожирение в большинстве случаев не являются противопоказанием к операциям. Существуют клиники и специалисты, которые могут избавить Вас от пожизненного ношения трубки. Уход за дренажной трубкой (эпицистостомой). Вас выписали из стационара с дренажной трубкой (цистостомой), которая находится в мочевом пузыре. Этот дренаж требует особого ухода, так как нарушение правил ухода может привести к закупорке дренажа или развитию воспалительного процесса. Необходимо выполнять следующие правила ухода за дренажом: 1. Проводить промывание дренажа 1-2 раза в сутки 2. Проводить смену повязки не реже 1 раза в день, а при загрязнении и чаще. Как проводить промывание дренажа в домашних условиях? Для этого потребуется: шприц Жане (продается в аптеках), раствор фурацилина, лоток, 70-процентный спирт. Как приготовить шприц Жане к использованию? Необходимо прокипятить шприц в течение 30 минут с момента закипания. Обработка шприца проводится перед каждым промыванием. После использования шприц тщательно промывается под проточной водой. Как приготовить раствор фурацилина? Готовый раствор фурацилина продается в аптеках. Если готового раствора нет, то можно приготовить фурацилин в домашних условиях. Для этого в аптеке необходимо приобрести фурацилин в таблетках. Перед промыванием надо залить 5 таблеток фурацилина 250 мл теплой кипяченой воды и дать таблеткам раствориться. На каждое промывание используйте 150-200 мл раствора. Раствор для промывания должен быть теплым. Как проводить промывание: - перед промыванием дренажа необходимо приготовить все необходимое, - тщательно вымыть руки, - набрать в шприц раствор фурацилина, - отсоединить удлинитель дренажа, - обработать спиртом конец дренажной трубки, - медленно ввести 30-50 мл фурацилина, затем отсоединить шприц для того, чтобы введенный фурацилин вышел и мочевого пузыря, - повторить процедуру, - оставшимся фурацилином промыть удлинитель дренажа, - обработать конец дренажной трубки и удлинитель спиртом и соединить их. Внимание! Если во время промывания появились боли, в моче появилась кровь или раствор вводится с трудом, а выделяется не из дренажа, а из раны, необходимо обратиться к врачу! Если произошло выпадение цистостомы, необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь! Как проводится смена повязки. Для этого потребуется: стерильный бинт, лейкопластырь, ножницы, спирт. Как поменять повязку: - приготовить все необходимое, - тщательно вымыть руки, - снять старую повязку, - обработать кожу вокруг дренажной трубки спиртом, - наложить новую повязку из стерильного бинта, - зафиксировать повязку лейкопластырем. Внимание! Если вокруг дренажной трубки появилась краснота, отек, гнойное отделяемое, обратитесь к врачу! Удачи!