

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина

Возраст: 36

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.07.2014 00:41:43

формирования заключения врача: 03.07.2014 21:37:51

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/288902/answer/288907>



Заключение врача

По протоколу цистоскопии картина действительно похожа на лейкоплакию на фоне хронического цистита, которые могут явиться причиной указанных жалоб. Насколько я понимаю, произвели трансуретральную резекцию участка лейкоплакии с последующей лазерной коагуляцией. Вмешательство было сделано по показаниям. И действительно, подобные хирургические процедуры производятся в стационарных урологических отделениях, чаще под спинальной анестезией (иногда, при незначительном объёме вмешательства, можно ограничиваться внутривенным наркозом). После ТУР мочевого пузыря по поводу лейкоплакии обычно назначают инстилляции уро-гиала. Это препарат для инстилляций мочевого пузыря, содержащий гиалуроновую кислоту - он восстанавливает гликозаминогликановый слой мочевого пузыря, очень эффективный (5-8 инстилляций). Проходят боли, рези, дизурия, учащенное мочеиспускание. Вводится 1 раз в неделю. Показания: хронический рецидивирующий цистит, интерстициальный цистит, дизурия после ТУРа. Препарат можете заказать по ссылке <http://03uro.ru/shop/urogial> .