

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Богакин Павел

Возраст: 41

Пол: Мужской

Врач:

ФИО:

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.07.2017 18:23:23

формирования заключения врача: 21.07.2017 22:33:57

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/294009/answer/294010>



Заключение врача

Уважаемый Павел! С большой долей вероятности у Вас имеется инфекция мочевых путей. То обследование, которое Вы представили, хотя и было достаточно объемным, ничего не говорит о здоровье Вашей партнерши - возможно, у нее есть инфекции, передающиеся половым путем. У Вас обследование на эти ИППП отрицательные, а у нее могут быть положительными. Но лечение в подобных случаях назначается обоим партнерам. Также Вы не пишете - были ли у Вас другие половые партнеры/акты после марта. Лечение, которое Вам проводилось, на мой взгляд, было избыточным - большое сомнение в этой клинической ситуации вызывают вобэнзим, магнитотерапия, лонгидаза и особенно - инстилляции колларгола. Инстилляции колларголом нигде в мире и в России не применяются, тем более у мужчин. Они приводят к повреждению слизистой оболочки уретры с последующим развитием стриктуры (сужения) уретры. Нужно обратиться на очный прием уролога для дообследования и выяснения причины симптомов. Заочные схемы лечения вряд ли будут эффективными.