

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: валерий

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 30.07.2017 16:14:24

формирования заключения врача: 31.07.2017 10:47:11

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/294018/answer/294021>



Заключение врача

Валерий, добрый день. Такая ситуация может быть проявлением проблем с предстательной железой, мочевым пузырем. Надо выполнить анализы на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), общий анализ мочи, УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (это обязательно, чтобы понять сколько мочи остается в мочевом пузыре после мочеиспускания, почему она потом вытекает), предстательной железы. Также надо выполнить УФМ - урофлоуметрию - для определения типа мочеиспускания. Все это поможет выяснить причину подтекания мочи. Пока проблема не решена, могу рекомендовать следующее: 1. Не перетерпите позыв на мочеиспускание, мочитесь как только позыв станет выраженным. 2. После мочеиспускания старайтесь расслабиться и "сдаивающими" движениями выдавить из мочеиспускательного канала остатки мочи. В любом случае, помочь можно. Если нужны контакты уролога - пишите.