

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** валерий

**Возраст:** 39

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.07.2017 16:14:24

**формирования заключения врача:** 31.07.2017 10:47:11

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/294018/answer/294021>



## Заключение врача

Валерий, добрый день. Такая ситуация может быть проявлением проблем с предстательной железой, мочевым пузырем. Надо выполнить анализы на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), общий анализ мочи, УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (это обязательно, чтобы понять сколько мочи остается в мочевом пузыре после мочеиспускания, почему она потом вытекает), предстательной железы. Также надо выполнить УФМ - урофлоуметрию - для определения типа мочеиспускания. Все это поможет выяснить причину подтекания мочи. Пока проблема не решена, могу рекомендовать следующее: 1. Не перетерпите позыв на мочеиспускание, мочитесь как только позыв станет выраженным. 2. После мочеиспускания старайтесь расслабиться и "сдаивающими" движениями выдавить из мочеиспускательного канала остатки мочи. В любом случае, помочь можно. Если нужны контакты уролога - пишите.