

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юлия

Возраст: 29

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.10.2017 21:02:45

формирования заключения врача: 10.10.2017 14:10:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/294533/answer/294541



Заключение врача

Добрый день! Вам надо постоянно контролировать общий анализ мочи. В случае изменении в моче нужен отвод от прививок на не менее 1 месяца после восстановления нормального общего анализа мочи. Мы в для постоянного контроль инфекции мочевых путей рекомендуем нашим пациентам делать ежедневный общий анализ мочи на портативном домашнем мочевом анализаторе под контролем уролога (мы это делам дистанционно - через мобильное приложение пациент может мгновенно связаться с врачами и обсудить результаты). Такой подход позволяет вовремя предупредить рецидив заболевания. Более подробная информация есть тут: 1) Информация об анализаторе мочи портативном «АМП-01» - http://ettagroup.ru/ 2) Тут наша публикация об опыте дистанционного мониторинга пациентов - http://ecuro.ru/article/distantsionnyi-monitoring-patsienta-posle-endoskopicheskoi-korrektsii-ustya-p ravogo-mochetoc Удачи!