

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 36

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 03.11.2017 14:15:04

**формирования заключения врача:** 05.11.2017 17:26:52

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/294749/answer/294766>



## Заключение врача

Добрый день! 1) Преждевременная эякуляция - эякуляция постоянно или эпизодически наступающая до достижения партнёрами удовлетворения от полового сношения и менее чем через 2 мин после интроекции и начала непрекращающихся фрикций умеренной частоты (25-30 в минуту) и максимальной амплитуды, что вызывает психический дискомфорт у сексуальных партнёров У Вас 10 минут - это нормально. 2) По поводу искривления полового члена Вам надо обратиться на очный прием к урологу, чтобы он осмотрел половой член на предмет поиска причины искривления. Очень часто искривление полового члена не видно в состоянии покоя полового члена и степень искривления полового члена можно увидеть только лишь в состоянии эрекции полового члена. Эрекцию очень сложно моделировать на приеме у уролога. И поэтому, часто, уролог просит сделать фото полового члена в состоянии эрекции в нескольких проекциях с приложенной к длиннику полового члена измерительной линейкой, чтобы был виден масштаб органа и его искривление. Вы также можете сделать. Это позволит Вам сэкономить время до постановки диагноза и позволит урологу выбрать лучшую тактику ведения. Если Вы пришлете эти фото нам, то мы так же можем помочь Вам советом. Удачи!