

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Екатерина

**Возраст:** 35

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.11.2017 00:50:03

**формирования заключения врача:** 27.11.2017 12:39:43

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/295021/answer/295030>



## Заключение врача

Добрый день! 1. Наличие инфекции может усложнить течение послеоперационного периода. Надо санировать мочевыводящие пути. И только потом делать операцию, пусть и эндоскопическую. Тем более по данным урографии нет выраженного расширения ЧЛС. 2. Мы готовы Вам помочь на базе у наших детских урологов-андрологов (заведующий отделом детской урологии - Рудин Юрий Эдвартович, доктор медицинских наук <http://uroline.ru/otdel-detskoi-urolologii>, тут личный сайт профессора - <http://www.drrudin.ru/>). Подробности на сайте - <http://uroline.ru/> Записаться к специалистам Вы можете по этим контактам: 1) 2) 3. В данном случае необходимо постоянный контроль инфекции мочевых путей. Мы в для этого рекомендуем нашим пациентам делать ежедневный общий анализ мочи на портативном домашнем мочевом анализаторе под контролем уролога (мы это делаем дистанционно - через мобильное приложение пациент может мгновенно связаться с врачами и обсудить результаты). Такой подход позволяет вовремя предупредить рецидив заболевания. Более подробная информация есть тут: 1) Информация об анализаторе мочи портативном «АМП-01» - <http://ettagroup.ru/> 2) Тут наша публикация об опыте дистанционного мониторинга пациентов - <http://ecuro.ru/article/distantcionnyi-monitoring-patsienta-posle-endoskopicheskoj-korreksii-ustya-p-ravogo-mochetoc> Удачи!