

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 41

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.11.2017 14:59:31

формирования заключения врача: 27.11.2017 18:09:56

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/295031/answer/295038>



Заключение врача

Добрый день! Проблемы с нарушением оттока мочи из почек или рефлюксирования мочи в верхние мочевые пути в подавляющем большинстве случаев приводят к развитию хронической инфекции мочевых путей. Даже после нормализации этих показателей инфекция еще может долгое время оставаться в организме. В Вашем случае, если отток из почек не нарушен и нет рефлюкса, то надо бороться с инфекцией мочевых путей. Для этого надо понять какая инфекция имеется в организме - сделать посев мочи на флору и чувствительность ее к антибиотикам. И, под контролем уролога, проводить длительную терапию (как правило, антибактериальную). В данном случае также крайне необходим постоянный (ежедневный) контроль инфекции мочевых путей. Мы в для этого рекомендуем нашим пациентам делать ежедневный общий анализ мочи на портативном домашнем мочевом анализаторе под контролем уролога (мы это делаем дистанционно - через мобильное приложение пациент может мгновенно связаться с врачами и обсудить результаты). Такой подход позволяет вовремя предупредить рецидив заболевания. Более подробная информация есть тут: 1) Информация об анализаторе мочи портативном «АМП-01» - <http://ettagroup.ru/> 2) Тут наша публикация об опыте дистанционного мониторинга пациентов - <http://ecuro.ru/article/distantcionnyi-monitoring-patsienta-posle-endoskopicheskoi-korreksii-ustya-p-ravogo-mochetoc> Удачи!