

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лина

Возраст: 30

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 30.11.2017 19:18:19

формирования заключения врача: 30.11.2017 22:11:58

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/295077/answer/295087>



Заключение врача

Добрый день! Для контроля стояния стента надо делать регулярные УЗИ почек, чтобы оценивать состояния верхних мочевых путей - нет ли расширения чашечно-лоханочной системы. Также надо контролировать общий анализ мочи. Ряду беременных в такой ситуации для контроля состояния мочевых путей, исключения воспаления в мочевых путях и контроля протекания беременности (мочевой инфекции, белка в моче, плотность мочи и пр.) мы рекомендуем проводить домашний мониторинг общего анализа мочи. Для этого можно использовать портативный анализатор мочи АМП-01 (<http://ettagroup.ru/> - тут подробности), с помощью которого наши пациенты дома могут контролировать 11 показателей общего анализа мочи, и через мобильное приложение мгновенно передавать информация врачам в , который могут корректировать ведение пациентки. Удачи!