

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Лина

**Возраст:** 30

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.11.2017 19:18:19

**формирования заключения врача:** 30.11.2017 22:11:58

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/295077/answer/295087>



## Заключение врача

Добрый день! Для контроля стояния стента надо делать регулярные УЗИ почек, чтобы оценивать состояния верхних мочевых путей - нет ли расширения чашечно-лоханочной системы. Также надо контролировать общий анализ мочи. Ряду беременных в такой ситуации для контроля состояния мочевых путей, исключения воспаления в мочевых путях и контроля протекания беременности (мочевой инфекции, белка в моче, плотность мочи и пр.) мы рекомендуем проводить домашний мониторинг общего анализа мочи. Для этого можно использовать портативный анализатор мочи АМП-01 (<http://ettagroup.ru/> - тут подробности), с помощью которого наши пациенты дома могут контролировать 11 показателей общего анализа мочи, и через мобильное приложение мгновенно передавать информация врачам в , который могут корректировать ведение пациентки. Удачи!