Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Мария

**Возраст:** 32

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.12.2017 20:03:53

**формирования заключения врача:** 18.12.2017 15:08:46

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://03uro.ru/consultations/question/295266/answer/295294

## Заключение врача

Добрый день! Это может быть как погрешности выполнения общего анализа мочи, так и проявление скрытой (бессимптомной) лейкоцитурии. Ряду беременных в такой ситуации для контроля состояния мочевых путей и контроля протекания беременности (мочевой инфекции, белка в моче, плотность мочи и пр.) мы рекомендуем проводить домашний мониторинг общего анализа мочи. Для этого можно использовать портативный анализатор мочи АМП-01 (http://ettagroup.ru/ - тут подробности), с помощь которого наши пациенты дома могут контролировать 11 показателей общего анализа мочи, и через мобильное приложение мгновенно передавать информация врачам в , который могут корректировать ведение пациентки. Удачи!