

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ильнур

Возраст: 33

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.08.2018 13:59:18

формирования заключения врача: 03.09.2018 19:51:40

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/298812/answer/298861>



Заключение врача

Добрый день. При таких показателях спермограммы наступление беременности может быть затруднено - снижено количество сперматозоидов и их подвижность. Нужно выяснить причину этого состояния - инфекции, воспаление и т.д. Параллельно с обследованием и основным лечением можете принимать препарат Мираксант (<http://miraxant.ru/>). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.