

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** валентина

**Возраст:** 61

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 10.02.2008 23:25:38

**формирования заключения врача:** 11.02.2008 10:09:54

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/29887/answer/29888>



## Заключение врача

Уважаемая Валентина! Это состояние называется стрессовой инконтиненцией мочи или недержанием мочи при напряжении. Обусловлено слабостью мышц тазового дна (у женщин чаще всего возникает после родов, гинекологических операций). В такой ситуации какие-либо консервативные методы лечения малоэффективны. На сегодняшний день хорошо зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи является субуретральный слинг. Это ряд операций, смысл которых заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Это TVT, TOT, IVS и др. Поэтому для решения этого вопроса Вам надо обратиться к урологу. Удачи!