

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.04.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 08.04.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/3000/answer/3001>



Заключение врача

Уважаемая Ирина! Уреаплазмы относятся к ИППП - инфекции, передающейся половым путем. Именно поэтому врач, проводящий лечение обязательно предупреждает пациента о воздержании на весь период лечения и до получения результата контрольного анализа. Презерватив не дает 100% гарантии. У женщин часто инфекция мочевыводящих путей сочетается с гинекологической патологией, а обострение симптомов цистита после половых контактов характерно для низкого расположения наружного отверстия уретры. В некоторых случаях при обострениях хронических заболеваний недостаточно применения одних антибактериальных средств, возникает необходимость применять иммуностимулирующие, противовоспалительные препараты, фитотерапию, физиопроцедуры, инстилляции лекарственных средств непосредственно в мочевой пузырь, т. е. лечение должно быть комплексным. В Вашей ситуации надо долечиться, не бросать на половине пути, потом через 1 месяц сдать контрольный анализ на уреоплазму. После этого определиться с дальнейшей тактикой. Пишите, буду рад помочь. [Шадёркин И.А.](#)