

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 36

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.01.2019 11:48:01

формирования заключения врача: 09.01.2019 16:37:22

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/300236/answer/300255>



Заключение врача

Здравствуйте! Имеет место снижение подвижности сперматозоидов и агглютинация, вследствие чего, вероятно, и имеет место снижение подвижности. Надо сделать анализ спермы на бакпосев(даже несмотря на малое количество лейкоцитов), на MAP-тест(на антиспермальные антитела), на фрагментацию ДНК. Могу рекомендовать препарат Мираксант (<http://miraxant.ru/>). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.