

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 43

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 08.06.2019 13:14:31

**формирования заключения врача:** 08.06.2019 16:57:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/301809/answer/301816>



## Заключение врача

Здравствуйте! К сожалению, стентирование мочеточника часто сопровождается дизурией, затруднением при мочеиспускании. Колечко (завиток) стента, который расположен в мочевом пузыре, раздражает стенку мочевого пузыря и вызывает все описанные вами неприятные ощущения. Принципиально опасен рефлюкс(заброс) мочи при мочеиспускании( в почку - мимо стента). Обратите внимание, нет ли боли в пояснице при мочеиспускании. Сделайте УЗИ почек и мочевого пузыря(сначала - с наполненным мочевым пузырём, потом - после мочеиспускания). С результатами - проконсультируйтесь с Вашим оперирующим урологом.