

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Элина

Возраст: 42

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.07.2019 11:23:32

формирования заключения врача: 14.07.2019 11:09:35

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/302098/answer/302111>



Заключение врача

Здравствуйте! Снижена подвижность, присутствует агглютинация. Надо сделать MAP-тест, обследоваться на наличие скрытого воспалительного уrogenитального процесса- сдайте сперму на бакпосев, уретральный мазок - на андрофлор. А пока могу рекомендовать препарат Мираксант (<http://miraxant.ru/>). На достоверность анализов он не влияет. По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.