

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 32

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.10.2019 14:28:20

формирования заключения врача: 14.10.2019 08:40:50

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/302843/answer/302875>



Заключение врача

Здравствуйте! По результатам спермограммы - астенозооспермия, патологических форм - на границе. Концентрация - тоже, в пределах нормы, но на границе. Причин повышения Ig G может быть много, в том числе - фаза выздоровления после первичной инфекции; острый период повторной инфекции. Могу рекомендовать препарат Мираксант (<http://miraxant.ru/>). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.