

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 78

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.12.2019 16:43:55

формирования заключения врача: 05.12.2019 20:09:25

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/303518/answer/303525>



Заключение врача

Здравствуйтесь! Постольку, поскольку травматичные медицинские вмешательства для Вас неактуальны в ближайшие полгода, по меньшей мере, сделайте МРТ малого таза, сделайте УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (превышение нормы которой само по себе вызывает рост ПСА), обсудите с Вашим урологом возможность проведения противовоспалительной терапии по поводу возможного простатита, а также прием препарата группы альфа-адреноблокаторов (типа омник), если еще не принимаете. И учтите, что анализ крови на ПСА нельзя сдавать раньше, чем через 2 недели после любых ректальных процедур, в том числе ректальное пальцевое исследование, очистительная клизма, использование лекарств в виде ректальных свечей и т.п. Удачи!