

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ярослав

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.04.2020 12:57:17

формирования заключения врача: 24.04.2020 18:58:54

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/305110/answer/305141>



Заключение врача

Здравствуйте! В подобных случаях исследуют наличие антиспермальных антител и у женщины. Кроме того, в данной ситуации обычно назначают проведение теста на фрагментацию сперматозоидов(делается одновременно со спермограммой). Также надо решить вопрос о тактике лечения варикоцеле. Необходима консультация вирусолога и иммунолога. Уже во время обследования можно рекомендовать препарат Мираксант (<http://miraxant.ru/>). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3- 6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.