

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ксения

**Возраст:** 42

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 31.05.2020 16:38:27

**формирования заключения врача:** 31.05.2020 17:04:06

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/305609/answer/305612>



## Заключение врача

Здравствуйте! Анализы ( общий анализ мочи, анализ мочи на бакпосев и уретральный мазок на фемофлор) надо сдавать на фоне обострения( но ДО начала лечения), или через месяц после окончания лечения. Также надо отследить возможности обострения после полового акта(бывает, так называемый, посткоитальный цистит). При этом рекомендуют сдавать эякулят на бакпосев и андрофлор партнёру . При рецидивирующей циститах рекомендуют применять Цисталис -эффективный трёхкомпонентный комплекс для борьбы с циститом. В частности, моносахарид Д-манноза, содержащийся в комплексе, предотвращает прикрепление кишечной палочки к стенкам мочевого пузыря, ускоряет выведение бактерий из мочевых путей, в 4 раза снижает вероятность развития рецидивов, продлевает периоды ремиссии при хроническом цистите. В целом Цисталис содержит комплекс природных средств, официально рекомендуемых для лечения и профилактики инфекций мочевых путей. Каждый из компонентов представлен в оптимальной дозе, необходимой для успешной борьбы с заболеванием. Состав комплекса уникален и сбалансирован. Удачи!