

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Антон

Возраст: 76

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.07.2020 21:07:38

формирования заключения врача: 25.07.2020 18:58:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/306149/answer/306208>



Заключение врача

Здравствуйте! Мы уже обсуждали этот вопрос. В первую очередь надо понимать, в чем причина невозможности самостоятельного мочеиспускания, - это - ключевой вопрос, тогда можно оценивать возможность восстановления акта мочеиспускания. Напишите - какая причина невозможности самостоятельного мочеиспускания, какой объём предстательной железы, какое значение ПСА. В отношении рецидива - в настоящее время, при возможности УЗ-навигации, обычно даже с повторной цистостомией(пункционной) - не возникает критических проблем, хотя, безусловно, эта хирургическая процедура, при вероятности спаечного рубцового процесса, сопряжена со значительными техническими трудностями. Навсегда оставлять уретральный катетер нельзя. Возможность удаления уретрального катетера с целью восстановления самостоятельного мочеиспускания и сопутствующую терапию(например, альфа- адреноблокаторы), необходимо обсудить, прежде всего, с лечащим врачом. Удачи!