

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Екатерина

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.04.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 13.04.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/3068/answer/3069>



Заключение врача

Уважаемая Екатерина! Причина Вашего состояния может быть связана как с воспалительными заболеваниями нижних мочевыводящих путей (цистит, уретрит), так и с функциональными изменениями в этих органах (гиперактивный мочевой пузырь). Чтобы выяснить точнее, Вам надо обследоваться: общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ (почек и мочевого пузыря), анализы на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды и др.). Если такое состояние возникает после половых контактов, то можно думать о низком расположении наружного отверстия уретры. В любом случае Вам понадобится помощь уролога и гинеколога, а лучше, если в Вашем городе есть такие специалисты, то урогинеколога. Пишите, с удовольствием Вам отвечу.