

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Рустам

**Возраст:** 35

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.11.2020 07:24:16

**формирования заключения врача:** 07.11.2020 10:52:26

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/306943/answer/306962>



## Заключение врача

Здравствуйте! Необходимо уточнение причины ПЭ. ПЭ может быть и первичного характера, и как осложнение воспалительного урогенитального процесса, а также как проявление повышенной чувствительности головки полового члена (которая сама по себе может быть проявлением хронического воспалительного процесса). Сдайте эякулят на бакпосев, уретральный мазок - на андрофлор. Сделайте ТРУЗИ предстательной железы, УЗИ органов мошонки, УЗДГ сосудов полового члена. При повышении чувствительности головки полового члена (изолированной) - можно рекомендовать местное применение, под презерватив, непосредственно перед половым актом - анестезирующего геля, при отсутствии аллергии к действующему веществу. Для защиты предстательной железы рекомендуем комплекс Гардапрост - способствует остановке роста и деления клеток предстательной железы, уменьшению выраженности воспаления, уменьшению разрастания соединительной ткани в предстательной железе. Удачи!