

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Наталья

**Возраст:** 44

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 03.12.2020 17:07:50

**формирования заключения врача:** 04.12.2020 10:20:02

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/307121/answer/307133>



## Заключение врача

Здравствуйтесь! Лечение вполне адекватно. До восстановления слизистой после хирургического вмешательства должно пройти не менее месяца, что объясняет лейкоцитурию. И сами по себе инстилляции провоцируют лейкоцитурию. Через 1,5 месяца после последнего приёма антибактериального препарата (это был цифран 1000мг/сутки курсом, как можно понять), сделайте бакпосев мочи. По окончании приёма канефрона можно рекомендовать комплекс Цисталис курсом (помогает бороться с возбудителем заболевания, способствует уменьшению боли и воспаления, укрепляет защитный слизистый барьер мочевого пузыря, снижает частоту повторных обострений). Удачи!